

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "AQUITAINE"

GIRONDE, DORDOGNE, LOT&GARONNE, LANDES, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

L. P. N° 47 - 33150 CENON-LA MORLETTE - TÉL. (56) 86.22.75 - 86.24.35

INSEE : 313244253-00016 - INSCRIPTION A LA C.A.P.P.P. N° 524 AD

ABONNEMENT ANNUEL

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes,
Direction Départementale de l'Agriculture

C. C. P. : BORDEAUX 670246 X

BULLETIN TECHNIQUE N° 29 - Jeudi 15 octobre 1981.

PSYLLE DU POIRIER

Un traitement à base de deltaméthrine, anciennement décaméthrine (Décis), fenvalérate (Sumicidin) ou perméthrine (Ambush, Perthrine) effectué dans les prochains jours est conseillé dans les vergers très infestés afin de réduire la population d'adultes hivernants. Prendre soin de bien mouiller les arbres.

Dans les vergers peu infestés, il n'est pas utile d'intervenir actuellement et on préférera effectuer un traitement aux colorants nitrés dans le courant de l'hiver, avant la ponte des femelles hivernantes.

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Ces champignons se conservent durant l'hiver dans les feuilles sous forme de périthèces qui libéreront au printemps les ascospores capables de contaminer le feuillage.

De nombreux vergers ont été atteints cette année par les tavelures, souvent depuis la période des contaminations primaires. Il convient alors de prendre certaines mesures préventives en autcme de façon à limiter les risques de contamination au printemps prochain en diminuant la formation des périthèces ou en les empêchant de devenir actifs.

On appliquera :

- . soit une pulvérisation sur le feuillage, au tout début de la chute des feuilles, d'une solution apportant 120 kg de perlurée (46 % d'azote) à l'hectare. Utiliser au moins 1000 litres d'eau/ha et veiller à une bonne dissolution de l'urée.
- . soit plus tardivement, une pulvérisation d'urée à la dose et au volume indiquée ci-dessus sur les feuilles tombées sur le sol.

Il est recommandé de ne pas faire d'associations de matières actives et de bien rincer l'appareil après traitement pour éviter la corrosion.

.../...

P437

CORYNEUM DES ARBRES FRUITIERS A NOYAU

Dans les vergers où sévit ce champignon (taches rouges, puis perforations au niveau des feuilles et petits chancres rougeâtres sur les jeunes rameaux de l'année) effectuer vers la fin de la chute des feuilles une pulvérisation cuprique à raison de 500 g de cuivre métal par hectolitre, sous forme de bouillie bordelaise de préférence. Vérifier auparavant le bon aoûtement du bois pour éviter le risque de phytotoxicité.

CHANCRE A FUSICOCUM DU PECHER

Dans les vergers contaminés par ce champignon, effectuer aux deux tiers environ de la chute des feuilles en traitement à base de benomyl (Benlate), carbendazime (nombreuses spécialités) ou thiophanate-méthyl (Pelt) en y ajoutant une huile ou un mouillant selon les recommandations du fabricant.

GRANDES CULTURES

NOCTUELLE DES GRAMINEES

(Cirphis)

De fréquentes attaques de la chenille de Cirphis unipuncta (noctuelle des graminées) sont observées dans les prairies et les cultures fourragères à base de graminées, ainsi que sur les gazons, en Chalosse, dans les Vallées des Gaves et le Béarn.

Les informations et conseils de lutte sont diffusés par le Service de la Protection des Végétaux par le moyen des répondeurs téléphoniques agrométéorologiques des Landes (58) 75.41.55., et des Pyrénées Atlantiques (59) 32.94.50, ainsi que sur les écrans ANTIOPE dans la région de PAU.

Imprimerie de la Station de CENON.
Directeur Gérant : J. THIAULT.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription phytosanitaire
"AQUITAINE"

M. LARGE